

ผลของการฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยติดเตียง ด้วยอุปกรณ์ฝึกเดินชนิดเคลื่อนย้ายง่าย ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

**Effect of a Walking Rehabilitation Program using a Portable, Self-administered
Walking Aid in Bedridden Patients in Bo Phloi District, Kanchanaburi Province**

ชญาทิตา สุภางค์อัมภา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบ่อพลอย

บทนำ



ผู้ป่วยติดเตียง



อุปกรณ์ฝึกเดินชนิดเคลื่อนย้ายง่าย




โปรแกรมฟื้นฟูการเดิน

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยติดเตียงด้วย
อุปกรณ์ฝึกเดินชนิดเคลื่อนย้ายง่ายด้วยตนเองที่บ้าน



อุปกรณ์ฝึกเดินชนิด เคลื่อนย้ายง่าย



โปรแกรมฟื้นฟูการเดิน

4 ขั้นตอน



วิธีการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1. โปรแกรมการฟื้นฟูการเดิน
2. อุปกรณ์ฝึกเดินชนิดเคลื่อนย้าย
ง่ายด้วยตนเองที่บ้าน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
2. แบบประเมินพฤติกรรม การดูแลตนเอง
3. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย
4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์เรล
5. แบบประเมินความสามารถในการ
ทรงตัวขณะเดินด้วยการทดสอบ
Time up and go test (TUGT)
6. แบบประเมินคุณภาพการเคลื่อนไหว
(quality of movement; QOM)

เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว
วัดผลก่อน และหลังทดลอง ระหว่าง
ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดเตียงใน
อำเภอปลอยจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 35 คน เลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง ผู้ป่วยได้รับอุปกรณ์ฝึกเดิน
ชนิดเคลื่อนย้ายง่ายด้วยตนเองที่บ้าน
และโปรแกรมการฟื้นฟูการเดิน
โดยผู้วิจัยเยี่ยมบ้าน 1 ครั้งต่อเดือน
และให้ผู้ป่วยฝึกเดิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
เป็นระยะเวลา 5 เดือน เก็บข้อมูลด้วย
แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา และการทดสอบค่าที่แบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน

เกณฑ์การคัดเข้า

เกณฑ์การคัดออก

- เกณฑ์การคัดเข้าคือ 1) มีคะแนน MBI 0-4 คะแนน
2) ไม่มีภาวะข้อติดที่ส่งผลกระทบต่อการเล่น
3) ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา

เกณฑ์การคัดออกคือ 1) มีโรคประจำตัวและความผิดปกติอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเล่น เช่น กระดูกและข้อแตกหัก (bone and joint fracture) คนพิการขาขาด (leg amputation) และโรคหัวใจขาดเลือด
2) สัญญาณชีพไม่คงที่ โดยค่าที่ใช้ความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง 90-160 ความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง 60-100 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส ชีพจรอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้ง/นาที การหายใจอยู่ระหว่าง 12-20 ครั้ง/นาที



อภิปรายผล

1

การฟื้นฟูการเดินด้วยอุปกรณ์ฝึกเดินที่บ้าน 5 เดือน ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์เรลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความสามารถในการทรงตัวขณะเดินอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการล้มปานกลางและมีคุณภาพการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอยู่ในระดับ Good อธิบายได้ว่าโปรแกรมฟื้นฟูการเดินที่ออกแบบมีเนื้อหาที่เน้นการดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เน้นการฝึกการทรงตัว และการกระตุ้นการรับรู้ของข้อต่อ

3

การฝึกการทรงตัวจะใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวสะโพก หลัง และขาทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ซึ่งจากการศึกษาของ Gillespie LD และคณะ พบว่าการป้องกันการล้มที่ได้ผลดี คือ การแก้ไขความบกพร่องด้านการทรงตัวโดยการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงและฝึกควบคุมการทรงตัว (Balance exercise) การยืนเดินและการเดินไปด้านหน้าหรือถอยหลัง ส่งผลต่อการทรงตัวไม่ต่างกัน สามารถใช้การฝึกการทรงตัวได้ทั้งสองแบบ วัตรสุดา ศรีบุรี และคณะ

4

อุปกรณ์ฝึกเดิน สามารถช่วยให้ผู้ป่วยทรงตัวได้ดีขึ้น การก้าวเดินง่ายขึ้น ไม่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เพราะมีอุปกรณ์ช่วยพยุงตลอดการเดิน ผู้ป่วยจึงรู้สึกมั่นใจ และกล้าที่จะก้าวเดิน อุปกรณ์ฝึกเดินมีข้อดี เช่น ต้นทุนราคาถูก สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้ประหยัดพื้นที่ในบ้าน สามารถดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในบ้าน มาใช้ทำอุปกรณ์ฝึกเดินได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต และคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์เรล
ของผู้ป่วยติดเตียงภายในเวลา 5 เดือน



01




02



03



04



ข้อเสนอแนะ

ควรนำโปรแกรมฟื้นฟูการเดินไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน (ischemic stroke) โรคหลอดเลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke) ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มป่วย เพราะจะเห็นผลเร็วที่สุดในการฟื้นฟู คือ ช่วงไม่เกิน 3 เดือน หากได้รับการรักษาอย่างทันเวลาจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว ลดการเกิดภาวะพิการ ลดอัตราการเสียชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ