


แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ่อย



ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงพร้อมผลเลือดบุคลากรและผู้ป่วย

() ผู้ป่วยมีผลเลือด Anti-HIV : Negative >> ไม่ต้องให้ Opep และไม่ต้องติดตามบุคลากรที่สัมผัส

() ผู้ป่วยมีผลเลือด Anti-HIV: Negative >> ต้องให้ Opep ภายใน 1-2 ชั่วโมง และไม่ควรถอดเข็ม 72 ชั่วโมง

() ไม่ทราบว่าคุณป่วยติดเชื้อ HIV หรือไม่ หรือไม่ทราบว่าเป็นเลือดของใคร หากกลัวว่าความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV หรือเลือด หรือ Body fluid ที่สัมผัส น่าจะเป็นของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV >> ต้องให้ Opep ภายใน 1-2 ชั่วโมง

สูตรยาแนะนำ : TDF (300mg)+3TC (300mg)+ วันละ 1 ครั้ง +LPV/r 400/100 mg ทุก 12 ชม. ครั้ง

สูตรทางเลือก : TDF (300mg) +3TC (300mg)+EFV (600mg) วันละ 1 ครั้ง

**หากมีปัญหาระงืดไต CrCl <60ml/min เปลี่ยน IDV > AZT (300mg) ทุก 12 ชั่วโมง